

„Lebensraumoptimierung der Ackerfeldflur durch Management von Ackerbrachen – Feldversuch zur Ackerbegrünung mit verschiedenen Saatmischungen“

Rieger-Hofmann Blüh- und Schutzstreifen Vorschlag

Pflanzengruppe	Lateinischer Name	Deutscher Name	Anteil in %
Leguminose einj.	Melilotus albus	Weißer Steinklee	2
Leguminose einj.	Medicago lupulina	Hopfenklee	3
Leguminose einj.	Trifolium incarnatum	Inkarnatklee	2
Leguminose mehrj.	Lotus corniculatus	Gew. Hornklee	3
Leguminose zweijährig	Melilotus officinalis	Gelber Steinklee	2,9
Leguminose zweijährig	Trifolium hybridum	Schwedenklee	2
Wildfutterpflanze	Fagopyron esculentum	Buchweizen	18
Wildfutterpflanze	Secale cereale	Waldstaudenroggen	10
Wildpflanze einj.	Papaver rhoeas	Klatschmohn	1
Wildpflanze einj.	Centaurea cyanus	Kornblume	7
Wildpflanze einj.	Verbascum nigrum	Schwarze Königskerze	0,8
Wildpflanze mehrj.	Artemisia vulgaris	Gew. Beifuß	0,1
Wildpflanze mehrj.	Achillea millefolium	Gew. Schafgarbe	1
Wildpflanze mehrj.	Leucanthemum ircutianum/vulgare	Margeriten	4
Wildpflanze mehrj.	Tanacetum vulgare	Rainfarn	0,1
Wildpflanze mehrj.	Plantago lanceolata	Spitzwegerich	2,9
Wildpflanze mehrj.	Silene dioica	Rote Lichtnelke	2
Wildpflanze mehrj.	Silene latifolia ssp. Alba	Weißer Lichtnelke	2
Wildpflanze mehrj.	Galium album	Weißes Labkraut	2
Wildpflanze mehrj.	Hypericum perforatum var. Perf	Echtes Johanniskraut	1,3
Wildpflanze mehrj.	Anthriscus sylvestris	Wiesen - Kerbel	1
Wildpflanze mehrj.	Heracelum sphondylium	Wiesen-Bärenklau	1
Wildpflanze zweijährig	Daucus carota	Wilde Möhre	2,9
Wildpflanze zweijährig	Dipsacus fullonum	Wilde Karde	1
Zwischenfrucht	Raphanus sativus	Örettich	5
Zwischenfrucht	Phacelia tanacetifolia	Büschelschön	10
Zwischenfrucht	Linum usitatissimum	Saat-Lein	10
Zwischenfrucht	Sinapsis alba	Weißer Senf	2

Eine gemeinschaftliche Initiative: